CLÍNICA VIVALDI · SCHEDA GRATUITA · DIPENDENZE

Disturbo da uso di inalanti

Inalare colle, solventi o gas per ottenere effetti psicoattivi. È particolarmente pericoloso negli adolescenti per il danno cerebrale e il rischio di morte improvvisa.

SEGNALI FREQUENTI

- Odore di prodotti chimici
- Capogiri, confusione o linguaggio impastato
- Irritazione al naso e alla bocca

INDICAZIONI PER TE

1. Assistenza medica urgente se ci sono sintomi
2. Togli i prodotti dalla sua portata
3. Intervento con il minore e la famiglia

PER LA FAMIGLIA E LE PERSONE VICINE

1. Togli i prodotti chimici dalla sua portata
2. Parla con calma e cerca un aiuto specializzato

QUANDO CHIEDERE AIUTO

1. Se perde conoscenza o respira male: 112
2. È particolarmente pericoloso nei minori

ELENCO DI SEGNALI DA CONTROLLARE

☐ Odora di colla, solventi o benzina

☐ Ha irritazione al naso o alla bocca

☐ Appare stordito/a o con il linguaggio impastato

☐ Ci sono barattoli, sacchetti o stracci con sostanze chimiche

☐ Il suo rendimento scolastico è calato

☐ Ha cambiato amici o si isola

☐ Ha frequenti mal di testa o nausea

☐ Fa fatica a concentrarsi

RISORSE GRATUITE

- Test online e indicazioni: clinicavivaldi.com/it/trastorno/trastorno-por-consumo-de-inhalantes
- Piano Nazionale sulle Droghe (Spagna): informazioni e risorse: https://pnsd.sanidad.gob.es/
- Fundación ANAR: aiuto a bambini e adolescenti (Spagna): https://www.anar.org/
- In Spagna: linea 024 (prevenzione del suicidio, 24 h) · Emergenze 112