CLÍNICA VIVALDI · SCHEDA GRATUITA · SPETTRO DELLA SCHIZOFRENIA E PSICOSI

Disturbo psicotico indotto da sostanze o farmaci

Deliri o allucinazioni causati dal consumo o dalla sospensione di una sostanza (cannabis, cocaina, anfetamine, alcol) o da un farmaco.

SEGNALI FREQUENTI

- Sintomi psicotici legati al consumo
- Paranoia o allucinazioni dopo l'uso
- Migliorano smettendo la sostanza

INDICAZIONI PER TE

1. Cerca assistenza medica urgente
2. Smetti la sostanza con un aiuto professionale
3. Tratta la dipendenza per evitare nuovi episodi

PER LA FAMIGLIA E LE PERSONE VICINE

1. Togli le sostanze e resta al suo fianco
2. Cerca assistenza medica: può essere un'intossicazione

QUANDO CHIEDERE AIUTO

1. Se ci sono agitazione, dolore al petto o confusione: 112
2. Se i sintomi non passano smettendo la sostanza

ELENCO DI SEGNALI DA CONTROLLARE

☐ Ha iniziato a sentire o vedere cose dopo l'uso
☐ È diventato/a diffidente o paranoico/a dopo l'uso
☐ Usa spesso cannabis, cocaina, anfetamine o alcol
☐ Ha iniziato da poco un nuovo farmaco
☐ È molto agitato/a o spaventato/a
☐ Non dorme
☐ Dice cose senza senso
☐ I sintomi sono comparsi con l'uso o smettendo

RISORSE GRATUITE

- Test online e indicazioni: clinicavivaldi.com/it/trastorno/trastorno-psicotico-inducido-por-sustancias-o-medicamentos
- Piano Nazionale sulle Droghe (Spagna): informazioni e risorse: https://pnsd.sanidad.gob.es/
- In Spagna: linea 024 (prevenzione del suicidio, 24 h) · Emergenze 112